

HOITO-OHJEET

ONNETTOMUUDET (KOLARIT, PUTOAMISET ym)

Eläin pidettävä mahdollisimman paikoillaan, rauhoittelu.

Shokkitila/järkytys voi saada eläimen voinnin näyttämään pahemmalta kuin loppujen lopuksi onkaan.

Pelko ja kipu voi tehdä eläimestä aggressiivisen, eli varottava, vaikka eläin ei muuten koskaan purisikaan ihmisiä. Pieniä eläimiä voi käsitellä esim. peiton kanssa, koiran kuonon sitoa, isoa koiraa ei välttämättä pysty käsittelemään lainkaan, ennen kuin rauhoittuu/rauhoitetaan.

Jos eläin vuotaa verta, leveä side pyyhkeestä tai mistä tahansa kankaasta verenvuotokohdan päälle ja ympärille, niin että painaa vuotokohdan tukkoon.

Jos haava on jalassa, kiristyside jalan juureen vain, jos muuten ei saa vuotoa tyrehdytettyä.

Yhteyttä eläinlääkäriin tarkastusta varten.

Jos ongelmana on vain tärskystä aiheutunut kipu, kipulääkkeistä voi käyttää koiralla asetyyilisalisyylihappoa tai ketoprofeenia. Muita kipulääkkeitä ei saa antaa. Kissalla kipulääkkeiden kanssa pitää olla vielä varovaisempi, lääkitys mieluummin eläinlääkäriltä tai aspiiriini samalla annoksella kuin koiralle, mutta voi antaa vain joka toinen tai kolmas päivä. Kipulääke voi aiheuttaa herkällä eläimillä mahahaavan tai verisen suolistotulehduksen, jotka pahimmassa tapauksessa voivat olla hengenvaarallisia.

Tassusiteen teosta erillinen ohje.

Jos jalka erittäin kipeä, esim. siinä on murtuma, on todennäköisesti paras jättää side tehtäväksi rauhoituksessa eläinlääkärillä.