

ELÄINKLINIKKA KURKI

Tarvitset:

- pumpulia
 - sideharsotaitoksia
 - sideharsoa
 - itseliimautuvaa joustavaa sidelaastaria
 - sakset
1. Puhdista haava tarpeen mukaan (esim. Betadine-paikallisantisepti). Laita varpaiden väliin pumpulisuikaleet ehkäisemään varpaiden hiertyminen toisiaan vasten.
 2. Laita vamman (esim. haava anturassa) päälle sideharsotaitoksia.
 3. Kiedo tassun ympärille muutama kerros pumpulia.
 4. Kiedo tassun ympärille muutama kerros sideharsoa.
 5. Laita sideharson päälle kerros itseliimautuvaa sidelaastaria. Sidelaastari vedetään ylhäältä alas tassun yläalhaalta ylös. Yläreunastaan sidelaastari kannattaa kiinnittää karvoihin jotta se pysyy paremmin paikoillaan.
 6. Kiedo tassu kokonaan sidelaastariin tukevasti. Side ei saa olla liian tiukka, koska se ehkäisee verenkiertoa, muttei toisaalta liian löysäkään, jottei se putoa pois.

Huom!

Tassuside vaihdetaan 2-3 vuorokauden välein, ja sitä pidetään yhteensä 10-14 vuorokautta. **Eläin ei saa päästä repimään eikä nuolemaan vammaa!** Kun vamma on alkanut parantua, voi suojana sisällä ollessa pitää pelkkää sukkaa.

Mikäli tassuside kastuu, se on vaihdettava heti. Ulkoilun ajaksi sitten suojaksi voi kiinnittää esim. muovipussin.